



SYNOMED
Enterobact®

Verzehrempfehlung:

Täglich mittags und abends je 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit optimalerweise eine halbe Stunde vor der Mahlzeit verzehren.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!

Das Produkt kühl und trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Enterobact®
Enterobact

Tabletten
Tabletten

Enterobact® Tabletten

Nahrungsergänzungsmittel

Tagesverzehrsmenge (2 Tabletten) enthält:

Fructooligosaccharide (FOS)	300 mg	(***)
Zink	10 mg	(100%*)
Selen	55 µg	(100%*)
Biotin	50 µg	(100%*)
Lactobacillus rhamnosus		(**)
Lactobacillus acidophilus		(**)
Lactobacillus casei		(**)
Lactobacillus paracasei		(**)
Lactobacillus salivarius		(**)
Bifidobacterium breve		(**)
Bifidobacterium bifidum		(**)
Bifidobacterium lactis		(**)
Bifidobacterium infantis		(**)
Bacillus subtilis		(**)
Enterococcus faecium		(**)

* Referenzmenge nach LMIV (NRV)

** 11 Bakterienkulturen mit insgesamt $1,1 \times 10^{10}$
kolonienbildende Einheiten (KBE) pro 2 Tabletten

*** Keine Empfehlung der LMIV vorhanden

Synomed GmbH, Flamweg 134
D-25335 Elmshorn



PZN -05499547

Enterobact[®]

10 Paketten



SYNOMED
Enterobact[®]

Zutaten: Füllstoff Mikrokristalline Cellulose, Fructooligosaccharide (FOS), Zinkgluconat, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (pflanzlich), Überzugsmittel Schellack, Füllstoff Siliciumdioxid, Natriumselenit, D-Biotin.

Ohne Gluten, Hefe, Farbstoffe oder Konservierungsstoffe. – Laktosefrei –

Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise.