



2 mg

2 mg

Nicotinell®

Lutschtabletten 2 mg Mint

Lutschtablette, gepresst
Nikotin

36
Lutschtabletten

Wenn Sie vor Beginn der Behandlung einen Rat benötigen, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! °C lagern. Nicht über 25 °C lagern. Apothekenpflichtig. Zul.-Nr. 56670.01.00

Jede Lutschtablette enthält 2 mg Nikotin (als Nicotinbis(4-R)-tartrat) 2 H₂O), 1 mg Nicotin (als Nicotinbis(4-R)-tartrat) 2 H₂O), und Natrium (E 965), Aspartam (E 951) und Natrium (E 965) pro Lutschtablette. Die Packungsbeilage beachten! Zur Anwendung in der Mundhöhle. Lutschtablette nicht kauen oder schlucken. Vor der Anwendung bitte Packungsbeilage lesen. Für Erwachsene über 18 Jahren.

Zur Unterstützung
bei der
Raucherentwöhnung





PZN -07006448

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
80258 München



NICOTINELL

Lutschtabletten 2_{mg} Mini

2_{mg}

36



2_{mg}



NICOTINELL

NICOTINELL
Lutschtabletten 2_{mg} Mint

2_{mg}



Anwendungsgebiet: Zur Linderung von Nikotin-entzugssymptomen, in Verbindung mit Raucher-entwöhnung und Rauchreduktion bei Rauchern, die motiviert sind das Rauchen aufzugeben. Vor Anwendung beiliegende Packungsbeilage beachten.

Eine Beratung und Betreuung des Patienten erhöhen in der Regel die Erfolgsraten.

Welche Lutschtablette brauche ich?

Rauchen:

- Weniger als 20 Zigaretten pro Tag: Nicotinell Lutschtabletten 1 mg Mint
- 20 bis 30 Zigaretten pro Tag: Sie können entweder Nicotinell Lutschtabletten 1 mg Mint oder Nicotinell Lutschtabletten 2 mg Mint anwenden
- Mehr als 30 Zigaretten pro Tag: Nicotinell Lutschtabletten 2 mg Mint

Richtige Lutschtechnik beachten:

1. Lutschtablette langsam lutschen, bis ein kräftiger, "pfeffriger" Geschmack entsteht.
2. Pause machen: Lutschtablette dabei zwischen Zahnfleisch und Wange "parken".
3. Wenn der kräftige Geschmack nachlässt, erneut mit dem Lutschen beginnen.
4. Diesen Lutsch-Rhythmus "Lutschen-Pause-Lutschen" den individuellen Bedürfnissen anpassen und bis zur vollständigen Auflösung der Lutschtablette wiederholen (ungefähr 30 Minuten).

Jede Lutschtablette enthält 2 mg Nikotin (als Nicotinbis[(R,R)-tartrat] 2 H₂O). Enthält Maltitol (E 965), Aspartam (E 951) und Natrium (9,8 mg pro Lutschtablette). Packungsbeilage beachten! Zur Anwendung in der Mundhöhle. Lutschtablette nicht Kauen oder Schlucken.

Vor der Anwendung bitte Packungsbeilage lesen. Für Erwachsene über 18 Jahren.

Wenn Sie vor Beginn der Behandlung einen Rat benötigen, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25 °C lagern.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 56670.01.00

2 mg

