

LactoStop



Nahrungsergänzungsmittel mit dem Enzym Lactase.

Inhalt: 100 Tabletten à 0,070 g = 7 g

L/ Mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenlasche

Lagerung: Unter 25°C und trocken lagern.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

LactoStop®

3300 FCC

Bei Lactose-Intoleranz
100 Tabletten



HÜBNER Naturarzneimittel GmbH

gesundheit leben

Lil-Dagover-Ring 7 • 82031 Grünwald • www.lactostop.de

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Personen, die von einer Laktose-Intoleranz betroffen sind, sollten sich bezüglich der Funktion von Lactase bei ihrer Ernährung beraten lassen.





Mit LactoStop® können Sie Milch und andere laktosehaltige Produkte wieder unbeschwert genießen. LactoStop® führt dem Körper das bei Laktose-Intoleranz fehlende Enzym Lactase zu. Bei Menschen, die Probleme mit der Verdauung von Laktose haben, verbessert Lactase die Laktoseverdauung.

Verzehrempfehlung: Verzehren Sie zeitgleich zu jeder Mahlzeit mit Milch und anderen laktosehaltigen Produkten zwei LactoStop® 3.300 FCC. Abhängig vom Laktosegehalt der aufgenommenen Nahrung, können Sie die Anzahl an Tabletten erhöhen bis keine Verdauungsbeschwerden mehr auftreten, jedoch pro Tag nicht mehr als 30 Tabletten. Es gibt Unterschiede bei der Laktose-Intoleranz. Die angegebene empfohlene maximale tägliche Verzehrsmenge darf aber nicht überschritten werden.

Enthaltene Menge	Pro 2 Tabl.	Pro 30 Tabl.
Lactase	6.600 FCC*	99.000 FCC*

* FCC = Food Chemical Codex-Einheit

Zutaten: Füllstoff Cellulose, Maltodextrin, Lactase (25%), Trennmittel: Polyvinylpolypyrrolidon, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren und Siliciumdioxid

Laktose-, Gluten-, Fructose- und Histaminfrei

Nahrungsergänzungsmittel mit dem Enzym Lactase.

Inhalt: 100 Tabletten à 0,070 g = 7 g

L/ Mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenlasche

Lagerung: Unter 25°C und trocken lagern.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

